

PLA D'ACTUACIÓ EN CAS DE PANDÈMIA (Grip)

ÍNDICE

ÍNDICE	2
1 OBJECTE.....	3
2 DEFINICIONS.....	3
3 RESPONSABILITATS.....	3
<i>Direcció</i>	3
<i>Coordinador pandèmia grip</i>	3
<i>Contractistes</i>	3
<i>Delegats de prevenció / Comitè de Seguretat i Salut</i>	3
4 ACTUACIONS	3
4.1 Organització interna	3
4.2 Control de la propagació de la malaltia i l'afectació de les persones en el lloc de treball.....	4
4.1.1 Mesures ambientals:	4
4.1.2 Mesures organitzacionals:	4
4.1.3 Mesures individuals:	5
4.1.4 Presència de casos de treballador amb Grip A o sospitós:	6
4.1.5 Vacunació / medicació:	6
4.2 Manteniment del pla.....	7
5 Minimització dels efectes de la pandèmia a funcionament de l'empresa	8
6 Recomanacions específiques segons el nivell de risc per als treballadors derivat de l'activitat durant el treball.....	8
6.1 Recomanacions per a tasques amb nivell de risc baix (no existeix risc derivat de l'activitat durant el treball)	9
6.2 Recomanacions per a tasques amb risc mitjà de contagi: ocupacions amb contacte freqüent amb persones presumiblement no afectades	9
6.3 Recomanacions per a tasques amb risc alt i molt alt de contagi: ocupacions amb contacte amb persones diagnosticades o amb sospita de patir la malaltia	9
7 DOCUMENTS I REFERÈNCIES	10
8 ANNEXOS.....	11

	PLA D'ACTUACIÓ EN CAS DE PANDÈMIA (Grip nova)	Ver. 3 Data: 6/9/2009
--	---	--------------------------

1 OBJECTE

Aquest pla ha de ser un suport organitzatiu per a actuacions que permetin protegir als treballadors/es que puguin veure's exposats al risc de contagi (seguint les recomanacions de l'autoritat sanitària), fent front a la reducció de la seva força.

2 DEFINICIONS

Grip nova o Grip A N1/H1

La grip pel nou virus A(H1N1) és una malaltia respiratòria contagiosa que conté elements d'un virus trobat als porcs, a les aus i als humans. Aquesta grip s'està transmetent de persona a persona en diversos països. La grip pel nou virus A(H1N1) és diferent de la grip comuna perquè està causada per un nou virus de la grip que apareix en humans.

Pandèmia

Epidèmia que s'ha estès geogràficament; desenvolupant-se en una regió o, fins i tot, a nivell mundial, i que ataca a la majoria de la població.

3 RESPONSABILITATS

Direcció

Facilitar mesures per la minimització de possibilitats de infecció pel virus A(H1N1)

Coordinador pandèmia grip

Difusió de la informació i implantació de mesures preventives.

Contractistes

Compliment d'instruccions donades a l'empresa

Delegats de prevenció / Comitè de Seguretat i Salut

participar en les tasques informatives i de comunicació per a que tots els treballadors rebin la suficient formació sobre la pandèmia.

4 ACTUACIONS

4.1 Organització interna

Coordinador Pandèmia Grip.

Persona que impulsa les accions dins de l'empresa.

- Identifica llocs de treball i nivells de risc.
- Identifica treballadors amb sensibilitats especials (els casos que impliqui coneixement de dades mèdiques, podran ser consultats a Vigilància de la salut del Servei de Prevenció).
- Difon la informació.
- Implanta mesures ambientals i organitzatives (treballadors d'empresa, contractistes,).

	PLA D'ACTUACIÓ EN CAS DE PANDÈMIA (Grip nova)	Ver. 3 Data: 6/9/2009
--	---	--------------------------

— Aplica protocol en cas de identificació de cas de grip A o sospitós.

4.2 Control de la propagació de la malaltia i l'afectació de les persones en el lloc de treball

Perquè una malaltia infecciosa es propagui ha d'existir una font d'infecció (en aquest cas, persona afectada), unes vies de transmissió (en el cas d'una malaltia respiratòria com és la grip, hi ha dues vies; directa: entre persones a través de les gotetes que provenen de la tos o esternut de la persona afectada i que queden suspeses en l'aire fins una distància d'un metre; o indirecta: des d'objectes i superfícies contaminades amb les gotetes o secrecions i un destinatari (persona que ha de ser-hi present)). Perquè una persona s'infecti han de ser-hi presents les tres circumstàncies (cadena de transmissió) i, per tant, les mesures per impedir la transmissió són les que trenquen la cadena.

Les mesures proposades, que tenen per objectiu reduir la propagació de la malaltia, estan centrades en les actuacions ambientals, organitzacionals i individuals.

4.1.1 Mesures ambientals:

- Realitzar la neteja de superfícies amb els productes habituals de forma freqüent (intensificar els punts de contacte amb múltiple població).
- Els llocs d'ocupació col·lectiva han de tenir ventilació. Promoure fer la feina en els llocs millor ventilats de l'empresa.
- Disponibilitat de recipients pel rebuig de mocadors.
- Disponibilitat de productes per la higiene de les mans (Sabó, paper eixugamans, recipient pel rebuig, també poden utilitzar-se solucions alcohòliques).
- Eliminar, en la mesura del possible, els objectes de difícil neteja.

4.1.2 Mesures organitzacionals:

- Tenir en compte la plantilla en funció dels grups de nivell de risc (*veure punt 6*).
- Establiu polítiques flexibles respecte al lloc de treball (p. ex.: el treball a distància) i als horaris (p. ex.: els torns alternats).
- Organitzar el treball de mode que es redueixi el número de treballadors exposats. S'han de preveure especialment eventuales restriccions laborals a treballadors amb sensibilitats especials (i en funció del nivell de risc):
 - Treballadors especialment sensibles a la grip (grups de risc).
 - Treballadores gestants.
 - Treballadors immunodeprimits.
- Promoure la realització de comunicacions via telèfon, e-mail, etc, reduint contactes interns i principalment sortides a l'exterior.
- Facilitar l'absència de treballadors/ores durant una pandèmia a causa de factors com l'afectació personal per grip o dels membres de la família.
- Estimular l'absència de qualsevol persona de la plantilla amb símptomes del virus.
- Promoure el protocol per a la higiene respiratòria i el maneig de la tos i la ràpida exclusió de qui tingui els símptomes del virus.
- Implementar pautes per modificar la freqüència i el tipus de contacte directe (p. ex.: donar-se la mà, lloc on seure a les reunions, la disposició a l'oficina, els llocs de treball compartits) entre els empleats i els clients (remeteu-vos a les recomanacions de l'autoritat sanitària). En cas que el contacte sigui inevitable, faciliteu que la distància entre les persones sigui de més d'un metre.

	PLA D'ACTUACIÓ EN CAS DE PANDEMIA (Grip nova)	Ver. 3 Data: 6/9/2009
--	--	--------------------------

- Establir una política de reincorporació al lloc de treball després de la malaltia, reduint els contactes al mínim.
- Establiu polítiques de restricció de viatges professionals a les àrees geogràfiques afectades (tant de llocs nacionals com internacionals).
- Informar al personal de plantilla sobre la situació de pandèmia i establir mecanismes de comunicació permanent durant el temps de durada de l'emergència:
 - Distribuir els programes i els materials que cobreixen els aspectes bàsics de la pandèmia, les estratègies de resposta i protecció personal i familiar (assegurar que arriba a tota la plantilla; independentment del tipus de contracte, gènere, tipus de jornada, tenint en compte la existència de diferències culturals i lingüístiques).
 - Distribució d'informació als treballadors/ores sobre la preparació que es fa a l'empresa.
- Si hi ha cas de treballador amb símptomes, es comunicarà al Coordinador Pandèmia Grip, es dirigirà el treballador al seu CAP o hospital (*veure punt 4.1.4*),

4.1.3 Mesures individuals:

Son les mesures que ha de prendre cada individu per protegir-se ell mateix del contagi o per protegir-ne les altres persones; La informació ho facilita.

- Cobrir-se la boca o el nas a l'esternudar o tossir.
- Evitar esternudar o tossir en direcció a un altre persona, o molt a prop.
- Intentar evitar que algú esternudi molt a la vora.
- Utilitzar mocadors rebutjables per netejar-se el nas.
- Després d'haver tossit o esternudar, rentar-se les mans amb aigua i sabó o amb alcohol o un preparat alcohòlic.
- Rentar-se les mans amb freqüència (i sempre en arribar a casa i abans de menjar)
- Evitar tocar-se els ulls, nas o boca.
- Practicar bons hàbits d'higiene.
- Dorm bé, tingues una alimentació saludable, beu aigua, duu una vida físicament activa, evita les begudes alcohòliques i el tabac.
- Cal animar i realitzar un seguiment de vacunació d'empleats contra la grip d'acord amb les recomanacions específiques de l'autoritat sanitària en cada moment.
- Persones potencialment afectades; minimitzar les interaccions amb altres persones.
- Acudir a l'atenció i assistència sanitària segons criteris de l'autoritat sanitària en cada moment.
- Quan s'estigui malalt:
 - Comunicar-ho al Coordinador Pandèmia Grip.
 - Consultar al metge quan sigui necessari.
 - Quedar-se a casa com a mínim una setmana des de el inici dels símptomes.
 - Evitar els llocs concorreguts.
 - Rentar i desinfectar amb freqüència les superfícies de contacte.
 - Mantenir ventilada la casa sense crear corrents brusques d'aire.
 - Mantenir el malalt en una habitació separada de les àrees comunes de la casa.
 - Evitar que les embarassades cuidin el malalt.
 - Si la persona malalta ha de sortir de casa (per anar al metge) haurà de portar una mascareta quirúrgica.
- En cas d'anar a centre sanitari, s'ha de fer:
 - Els centres sanitaris estan preparats per donar la informació i l'atenció adequada. Cal adreçar-se directament al taulell d'informació i comuniqui la vostra sospita sobre la malaltia.

	PLA D'ACTUACIÓ EN CAS DE PANDEMIA (Grip nova)	Ver. 3 Data: 6/9/2009
--	--	--------------------------

- Mentre s'espera l'atenció, us demanaran que us poseu una mascareta quirúrgica, que respecteu les normes d'higiene i que esternudeu o tossiu utilitzant mocadors de paper d'un sol ús -i els llenceu, després, en una bossa de plàstic- i us renteu bé les mans. També us indicaran que espereu en una àrea preparada per a aquests casos on hi ha uns quants seients separats més de tres metres de la resta de persones (no és necessari establir separacions físiques amb els altres pacients).
- Durant la visita es recolliran, en la vostra historia clínica habitual i en l'enquesta epidemiològica, dades d'interès per a les actuacions assistencials i de prevenció de la malaltia (país o països que heu visitat, contactes propers que heu tingut).
- A criteri del metge o metgessa que us atengui, us derivaran a l'hospital, amb la informació clínica necessària, per fer la presa de mostres biològiques (per exemple, secrecions respiratòries del nas i de la faringe) i analitzar-les, així com per iniciar el tractament.

4.1.4 Presència de casos de treballador amb Grip A o sospitós:

Els casos sospitosos que puguin ser detectats en l'àmbit laboral hauran de ser derivats de forma prioritària al centre d'assistència primària, CAP, que correspongui, i si no és possible, al centre hospitalari de referència i s'aconsellarà a la resta de treballadors que continuïn amb normalitat la seva activitat laboral.

*Els símptomes són similars als de qualsevol grip: febre (més de 38°C), tos i malestar general.
També es pot tenir mal de cap, mal de coll, esternuts, dolors musculars i, de vegades, diarrea i vòmits.
El més freqüent és que la grip evolucioni favorablement en 2-4 dies encara que es pugui continuar amb tos una setmana i sentir cansament durant les setmanes següents a l'inici de la malaltia. Atès que és un virus nou encara no s'ha determinat amb exactitud la severitat del quadre clínic que produeix encara que, fins al moment la malaltia és lleu en la majoria dels casos.*

En el cas de que es confirmi el diagnòstic de grip A/ H1N1 a algun treballador, serà important dur a terme, en aquell espai de treball, cal tenir en compte tots els possibles contactes laborals del treballador afectat:

- Que han estat en estret contacte (1 metre) amb l'afectat.
- Que han tingut un contacte pròxim i tinguin associades malalties cròniques (respiratòria, cardíaca, diabetis,...)

S'aconsellarà a aquests treballadors que continuïn amb la seva activitat laboral amb normalitat, posant atenció durant 10 dies a la possible aparició de símptomes de sospita.

El virus es pot transmetre des d'un dia abans de començar amb els símptomes fins a 7 dies després. El virus de la grip presenta una capacitat màxima de contagi els 3 primers dies des de que comencen els símptomes, però es pot seguir transmetent fins a 7 dies després, per la qual cosa es recomana quedar-se 7 dies a casa per assegurar-se de no transmetre el virus a altres persones.

4.1.5 Vacunació / medicació:

	PLA D'ACTUACIÓ EN CAS DE PANDÈMIA (Grip nova)	Ver. 3 Data: 6/9/2009
--	---	--------------------------

Vacunació

La vacuna contra la grip comuna no dona protecció en aquest cas, ja que es tracta d'un tipus de virus totalment nou.

Respecte a la vacuna de la grip A/H1N1 és Sanitat pública qui s'encarrega de subministrar-les als grups de risc que s'han definit com a grups diana. *[Els Serveis de Prevenció de Riscos Laborals no disposaran de vacunes contra la grip A]*

Principals acords de la reunió del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut sobre grip A/H1N1 (Font: Departament de Salut –Generalitat de Catalunya- Data de publicació: 01/09/2009)

Acords entre les comunitats autònomes i el Ministeri de Salut per planificar les diferents actuacions i estratègies per actuar contra la pandèmia de grip A/H1N1.

Definició dels primers grups diana als quals se'ls administrarà la vacuna de la grip A/H1N1:

Rebran aquesta vacuna:

- les embarassades,
- les persones a partir de sis mesos d'edat amb malalties cròniques
- els professionals de la sanitat
- el personal de serveis essencials (bombers, protecció civil i cossos i forces de seguretat).

La vacunació contra la grip A:

començarà previsiblement a finals d'octubre o principis de novembre quan compti amb l'autorització de l'Agència Europea del Medicament. El Ministeri de Sanitat ha fet una reserva de vacuna addicional per si fos necessari.

Medicaments

Els medicaments antivirals no curen, però ajuden si s'administren dintre de les 48 hores posteriors als primers símptomes:

- alleujant alguns símptomes
- reduint la durada de la malaltia
- reduint la probabilitat de complicacions importants, com la pneumònia

El Departament de Salut disposa de medicaments antivirals per tractar les persones que calgui d'acord amb els criteris de tractament establerts en el protocol d'actuació amb relació a aquesta grip.

En tots els casos cal que aquesta medicació sigui receptada per un metge/metgessa. La utilització dels medicaments antivirals d'una manera indiscriminada pot facilitar l'aparició de soques del nou virus A(H1N1) resistents a aquests fàrmacs i, per tant, fer que deixin de ser eficaços per tractar les persones que ho requereixin.

4.2 Manteniment del pla

- Estar atents a possibles canvis en les informacions de l'autoritat sanitària. Aquesta informació està disponible a: <http://www.gencat.cat/salut/>

	PLA D'ACTUACIÓ EN CAS DE PANDÈMIA (Grip nova)	Ver. 3 Data: 6/9/2009
--	---	--------------------------

- Actualitzar el pla si es necessari.

5 Minimització dels efectes de la pandèmia a funcionament de l'empresa

Considerar, segons l'activitat i necessitat funcional, de quina forma es poden minimitzar els efectes al funcionament de l'empresa.

- Cal tenir en compte les tasques essencials i altres participacions fonamentals (p. ex.: matèria primera, proveïdors, serveis/productes de subcontractistes i logística) així com les persones essencials que les duren a terme per mantenir les operacions de l'empresa, per ubicació i funció, durant una pandèmia.
- Preveure la capacitat i preparació dels possibles substituïts.
- Amb la línia jeràrquica, cal que s'estableixi el com es faran les comunicacions de casos. Aquest pla inclou la identificació de contactes clau (amb substituïts), cadena de comunicacions (considerant el possible efecte de contractistes), i els processos per al seguiment i la comunicació de l'estat de l'empresa i els empleats/ades.

Altres consideracions organitzacionals

- Caldria determinar el 'impacte potencial d'una pandèmia en les finances de l'empresa utilitzant escenaris possibles i múltiples que afectin les diferents línies de productes i/o els llocs de producció.
- Cal considerar el impacte potencial d'una pandèmia en viatges internacionals i nacionals relacionats amb els negocis (p. ex.: quarantenes, tancaments de fronteres).

6 Recomanacions específiques segons el nivell de risc per als treballadors derivat de l'activitat durant el treball

El nivell de risc depèn, en part, de la necessitat de mantenir la proximitat amb persones potencialment afectades pel virus.

Ocupacions amb nivell de risc baix	no existeix risc derivat de l'activitat durant el treball: Totes les feines que no inclouin l'atenció al públic de manera freqüent ni continuada.
Ocupacions amb risc mitjà	ocupacions que requereixen del contacte freqüent a menys d'un metre amb persones presumiblement no afectades (companys de feina, públic en general, alumnes.. .)
Ocupacions amb risc alt	ocupacions amb contacte amb persones diagnosticades o amb sospita de patir la malaltia. Ex.: metges/metgesses i personal d'infermeria que atenen directament persones afectades, personal de transport d'emergències de persones amb sospita de patir la malaltia...
Ocupacions amb risc molt alt	ocupacions amb altes exposicions a concentracions altes de virus en el marc de procediments específics mèdics o de laboratori. Ex.: tècnics de laboratori que treballin amb el virus, procediments que suposin generació d'aerosols (maniobra de reanimació, intubació, presa de mostres respiratòries, ventilació manual, aspiració nasofaríngia, broncoscòpia, nebulitzacions, inducció de l'esput, fisioteràpia toràcica, cures de traqueotomia, cirurgia i procediments post mortem en els quals s'utilitzen instruments que funcionen a alta velocitat, alguns procediments dentals...).

	PLA D'ACTUACIÓ EN CAS DE PANDEMIA (Grip nova)	Ver. 3 Data: 6/9/2009
--	--	--------------------------

6.1 Recomanacions per a tasques amb nivell de risc baix (no existeix risc derivat de l'activitat durant el treball)

Per a difusió a totes les persones en feines que no incloquin l'atenció al públic les recomanacions següents (recomanacions higièniques generals per a la població)

- Cal cobrir-se la boca i el nas amb un mocador d'un sol ús quan tossiu o esternudeu.
- Llenceu els mocadors d'un sol ús al cistell d'escombraries.
- Tossiu o esternudeu a la part superior de la màniga si no teniu mocadors d'un sol ús.
- Cal netejar-se les mans després de tossir o esternudar.
- Utilitzeu aigua i sabó o un netejador de mans a base d'alcohol.
- Renteu-vos les mans regularment amb aigua i sabó i, especialment, després de tossir, esternudar o d'haver utilitzat un mocador. Renteu-vos-les en el moment d'arribar a la feina i en el moment d'arribar a casa.
- Cal quedar-se a casa si s'està malalt

6.2 Recomanacions per a tasques amb risc mitjà de contagi: ocupacions amb contacte freqüent amb persones presumiblement no afectades

Per a les persones treballadores amb aquest nivell de risc cal afegir aquestes recomanacions a les recomanacions higièniques bàsiques

- Cal que es mantingui una distància entre persones, a més d'1 metre.
- Establiu els canvis en els procediments de treball que facilitin la feina a distància (informació telefònica no presencial, en línia...).
- Establiu barreres físiques amb els clients sempre que sigui possible.

6.3 Recomanacions per a tasques amb risc alt i molt alt de contagi: ocupacions amb contacte amb persones diagnosticades o amb sospita de patir la malaltia

Per a les persones treballadores amb aquest nivell de risc cal afegir aquestes recomanacions a les recomanacions higièniques bàsiques

- Facilitau els equips de protecció que es recomanen específicament.
- Determineu (els empresaris amb la participació dels treballadors o els seus representants) els procediments de treball que es podrien modificar per eliminar o minimitzar-ne el risc.
- Aïlleu les persones afectades que han de ser ateses pels treballadors/ores i establiu, si cal, barreres físiques.
- Reduïu al mínim el nombre de treballadors/ores que han de tenir contacte amb persones afectades o amb sospita d'afectació.
- Utilitzeu equips de protecció individual (EPI) d'acord amb l'exposició seguint les recomanacions de l'autoritat sanitària específiques de cada moment.

En general se seguiran els criteris següents:

La utilització dels EPI ha de basar-se en l'evidència disponible i guardar proporcionalitat amb el risc que es generi per contacte amb les secrecions respiratòries. A més, s'ha d'adequar a les característiques de transmissibilitat del virus en cada fase.

- Protectors respiratoris:

- Serveixen per prevenir la inhalació d'agents infecciosos que provenen de les vies respiratòries i es troben continguts als nuclis goticulars o aerosols suspesos a l'aire. S'han de rebutjar després de cada utilització. Han de quedar sempre degudament adaptats al nas i a la boca.
- Protector respiratori tipus FFP2
 - S'ha d'utilitzar en els procediments rutinaris d'aïllament, com a mesura preventiva de transmissió aèria ordinària, per part de:
 - El personal sanitari que atén directament els casos confirmats o sospitosos o persones que treballen en situacions de contacte directe i prolongat amb casos.
 - El personal auxiliar, incloent-hi personal de neteja, personal de bugaderia que pugui tenir contacte amb el pacient, amb restes de sang o secrecions corporals.
 - El personal de laboratori que manipula mostres de malalts. - Els familiars que participen en la cura dels pacients.
- Protector respiratori tipus FFP3

Està indicat en els procediments que suposin generació d'aerosols (maniobra de reanimació, intubació, presa de mostres respiratòries, ventilació manual, aspiració nasofaríngia, broncoscòpia, nebulitzacions, inducció de l'esput, fisioteràpia toràcica, cures de traqueotomia, cirurgia i procediments post mortem en els quals s'utilitzen instruments que funcionen a alta velocitat). Aquests procediments s'han de fer sempre amb la porta tancada i hi ha de ser-hi present només el personal que els practica.

[Val a dir que els FFP3 es poden utilitzar en lloc dels FFP2, ja que ofereixen un nivell de protecció superior.]
- Guants, bata, davantal d'un sol ús.
- Ulleres protectores.
- Procediment escrit que cal seguir per posar-se i treure's els EPI.

Protecció de l'embaràs: és important tenir en compte totes les treballadores en situació d'embaràs i les que en el seu lloc de treball duguin a terme una tasca amb alt risc d'exposició de contagi de la malaltia. En aquest cas es recomana prendre mesures especials de canvi de lloc de treball, cosa que garanteixi eliminar l'exposició derivada de l'activitat laboral.

7 DOCUMENTS I REFERÈNCIES

Document base principal: Recomanacions a les empreses per a la planificació de les mesures d'emergència en cas de pandèmia de grip. Edició: Departament de Treball, Generalitat de Catalunya

Complements: Guía para la elaboración del plan de actuación de las empresas o centros de trabajo frente a emergencias pandemia de gripe, julio 2009. Edición: Ministerio de Sanidad y Política Social.

· La informació sanitària referida a la grip es pot trobar a: <http://www.gencat.cat/salut/>

Disponibilitat de informació

Sanitat Respon (les 24 h): 902 111 444

Web del Departament de Salut [<http://www.gencat.cat/salut/>]

Ministeri de Sanitat i Política Social [<http://www.msc.es/>]

Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de la Malaltia [<http://ecdc.europa.eu/>]

Organització Mundial de la Salut [<http://www.who.int/es/>]

	PLA D'ACTUACIÓ EN CAS DE PANDÈMIA (Grip nova)	Ver. 3 Data: 6/9/2009
--	---	--------------------------

Centres per al Control i la Prevenció de la Malaltia. EUA [<http://cdc.gov/>]
Telèfon d'informació sanitària 630976109

Telèfons de les unitats de vigilància epidemiològica

Agència de Salut Pública de Barcelona (Barcelona ciutat)
Servei d'Epidemiologia 932 384 545

Serveis Territorials de Salut a Barcelona
Unitat de Vigilància Epidemiològica de la Regió
Barcelonès Nord i Maresme 935 671 160
Unitat de Vigilància Epidemiològica de la
Regió Centre 937 361 260
Unitat de Vigilància Epidemiològica de la Regió
Costa de Ponent 934 213 255
Unitat de Vigilància Epidemiològica de la Regió
Catalunya Central 938 753381

Serveis Territorials de Salut a Girona
Secció d'Epidemiologia 972 200 054

Serveis Territorials de Salut a Lleida
Secció d'Epidemiologia 973 701 600

Serveis Territorials de Salut a Tarragona
Secció d'Epidemiologia 977 224 151

Serveis Territorial de Salut a les Terres de l'Ebre
Secció d'Epidemiologia 977 44 96 25

8 ANNEXOS

Annex 1 Pla d'accions específiques a l'empresa
Annexos informatius